

Name: _____ Nark.-Datum: _____
 Vorname: _____ Anästhesist: _____
 Geb.-Datum _____ Operateur: _____
 Operation: _____ Allergie: _____

Anordnung für den Aufwachraum:

Infusion bis	Uhr	500 ml NaCl	1000 ml Na Cl	500 ml Ringer	1000 ml Ringer
Analgesie	4-6 stdl.	Novalgin-Kurzinf. 1g	Novalgintropfen 20/40°	Dipidolor mg i.v.	Dipidolor Amp. s.c.
	6 stdl.	Perfalgan 1g i.v.	Paracetamol Supp. 250 500 750 1000 mg		

Trinken ab _____ Uhr BZ messen

Aufwachraumprotokoll

Aufwachraum-Schw./Pflg.:

		15	30	45	15	30	45	15	30	45	15	30	45
Infusion:	220												
Ringer (ml)	210												
NaCl 0,9% (ml)	200												
	190												
	180												
	170												
	160												
Paracetamol Supp.	150												
Perfalgan i.v.	140												
Novalgin Tropfen	130												
1g Novalgin-Kurzinfusion	120												
Dipidolor i.v. (mg)	110												
Dipidolor s.c.(Amp.)	100												
Paspertin i.v.	90												
Clonidin i.v.	80												
	70												
O ₂ -Nasensonde l/min	60												
	50												
	40												

O₂ Sättigung (%) _____

Drainage _____ ml

Anordnung für die Station

Puls und RR messen: bis _____ Uhr **1/2** stdl. bis _____ Uhr **1** stdl. ab _____ Uhr **3** stdl.

Bei Schmerzen: 4-6 stdl. 1/2 - 1 Amp. Dipidolor s.c. 4-6 stdl. Novalgin 1g als Kurzinfusion i.v.
 6 stdl 1 Tabl Talvosilen forte ab _____ Uhr Novalgin 40° Tropfen per os

12 stdl. Diclofenac Supp. oder per os 50 / 75 / 100 mg

Bei Übelkeit: 1 Amp. Paspertin / Infusio 1 Amp Zofran i.v.

Trinken ab _____ Uhr

Bettruhe bis _____ Uhr Hausmedikation weiter ab _____ Uhr